



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAC-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	1.04.2013
Dokümantasyon No	İY.LS.11
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	6
Sayfa Sayısı	7

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUCU
Adenozin (ADOZIN IV ENJEKSİYON VE INFUZYON İCİN COZELTI İCEREN AMPUL)	kafein	Kafein alımı sınırlandırılmalıdır. Kafein içeren besin ve içeceklerden uzak durulmalıdır.
Aktif kömür (optimaven)	Süt, dondurma, şerbet ya da marmelat	Aktif kömürün etkinliği azalabileceğinden, süt, dondurma, şerbet ya da marmelat ile karıştırılmamalıdır.
Allopurinol (urikoliz)	Alkol	Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.
Alprazolam (xanax)	Alkol, kafein, greyfurt suyu	Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır.
Aminofilin (aminocardol)	Kafein	Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.
Amiodaron (AMIDOVİN ampul)	Greyfurt	Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır. Greyfurt ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır.
Amlodipin (norvasc)	Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları ,greyfurt veya greyfurt suyu	Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmamalıdır.Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır.
Ampisilin-sulbaktam (sulcid)	,,,,,	Aç karnına alınmalıdır
Aripiprazol (abizol tablet)	Alkol	Alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Merkezi sinir sistemi etkilerini artırabilir.besinlerle birlikte alındığında biyoyararlanımı etkilenmemektedir.
Asetil salıslık asit (ecopirin)	Alkol, C vitamini, folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak,bezelye, portakal, mercimek), demir (Tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Alkol, serum asetil salisilik asit seviyesini %50 - %100 oranında arttırmaktadır.diğer belirtilen besinler ialcın etkisini azaltır.
Asiklovir (asimplex flakon)	,,,,,	Sıvı alımı arttırılmalıdır
Atorvastatin (tarden)	Greyfurt suyu	Sitokrom p450 enzimlerinde inhibisyon ve ilacın etkisinin çok uzun süre devam etmesi ,toksik etkiler gözlenmesi
Atropin	Alkol	Alkolle birlikte kullanılmamalıdır



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	1.04.2013
Dokümantasyon No	İY.LS.11
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	6
Sayfa Sayısı	7

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUCU
Azitromisin (azro,azitro)	Aluminyum ve magnezyum içeren antiasit preparatları	Aluminyum veya magnezyum içeren antiasit preparatları veya gıda takviyeleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.
Bortezomib	Vitamin c, yeşil çay	Vitamin C (askorbik asit) içeren gıda, multivitamin ve preparatlardan kaçınılmalıdır. Askorbik asit bortezomibin terapötik etkisini azaltabilir. Yeşil çay, bortezomibin antineoplastik etkisini azaltır. Yeşil çay ekstraktları ve yeşil çay içeren gıda takviyeleri ile birlikte alınmamalıdır.
C vitamini	Süt ve süt ürünleri, kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	Etki azalması
Cales (betametazon)	,,,,,	GİS İritasyonunu azaltmak için yemekle birlikte alınmalıdır.
Carvexal tb(karvedilol)	,,,,,	Besinlerle birlikte alındığında biyoyararlanımı etkilenmemektedir ancak absorpsiyon hızı azalır.
Cefaks tb (sefuroksim)	,,,,,	Absorpsiyonu arttırmak için besinlerle birlikte alınmalıdır.
Cetryn 10 mg tb(setirizin)		Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.
Ciprasid tb (siprofloksasain)	Kafein,süt ve süt ürünleri,kalsiyum içeren gıda ve preparatlar,demir, Alüminyum tuzları ve antiasitler	Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Alınmadan önce 2 saat boyunca veya alındıktan sonra 6 saat boyunca süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler) ve preparatlar, demir, alüminyum tuzları ve antiasitlerden kaçınılmalıdır. Bol su ile alınmalıdır.
Coversyl-plus (perindopril-indapamid)	Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.) ), Capsicum (Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar, potasyum	Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.) ), Capsicum (Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar antihipertansif etkiyi azaltacağı için birlikte kullanılmamalıdır. Potasyum atılımı azalabilir. Potasyum tuzu içeren gıda veya preparatların kullanımı hiperkalemi riskini artırır.
Cytotec tb(misoprostol)	,,,,,	Diyare etkisini azaltmak için yemeklerle birlikte alınması önerilir.



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	1.04.2013
Dokümantasyon No	İY.LS.11
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	6
Sayfa Sayısı	7

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUCU
Damperidon (motilium,motis)	,,,,,,	Yemekten 15 dakika veya yarım saat önce alınmalıdır.
Deksamethazon (dekort)	Alkol, greyfurt suyu	Diyare etkisini azaltmak için yemeklerle birlikte alınması önerilir.
Delix 5mg tb (ramipril)	Alkol,Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.)), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar ,potasyum	Alkol, ramiprilin vazodilatör etkisini artırabilir. Alkolle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.)), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar antihipertansif etkiyi azaltacağı için birlikte kullanılmamalıdır.Ramipril, potasyum atılımını azaltır. Potasyum içeren gıda alımı hiperkalemi riskini artırır.
Demir Preparatları	Süt ve süt ürünleri,kalsiyumdan zengin besinler(pekmez,susam, fındık,fıstık,kurutulmuş meyveler,kuru baklagiller,yeşil yapraklı	Demir etkisi azalır.
Depakin (sodyum valproat)	Alkol, süt	Alkol ve süt ile birlikte kullanılmamalıdır
Diazepam (diazem)	Alkol, greyfurt ve greyfurt suyu, kafein	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır.
Dideral 40mg tb (propranolol)	Alkol,Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmamalıdır.
Digoxin	Avokado,sodyum,süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve preparatlar, demir, alüminyum tuzları ve anti-asitler,potasyum,Sarımsak (Allium sativum), Zencefil (Zingiber officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi (Aesculus hippocastanum) besinleri ve preparatları,meyan kökü	Avokado ile birlikte kullanılmamalıdır. Kepekli ve yüksek lifli gıdalardan kaçınılmalıdır. Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe fazla tuz/sodyum almından kaçınılmalıdır. Alınmadan önce 2 saat boyunca veya alındıktan sonra 6 saat boyunca süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve preparatlar, demir, alüminyum tuzları ve anti-asitlerden kaçınılmalıdır. Potasyum tuzu içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır. Sarımsak (Allium sativum), Zencefil (Zingiber officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi (Aesculus hippocastanum) besinleri ve preparatlarının alımı kısıtlanmalıdır. meyan kökü kontrendikedir.
Diklofenak sodyum(voltaren)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. GIS irrigasyonunu önlemek için tok alınmalı.
Diltiazem (diltizem)	Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları	Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmamalıdır.



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAC-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	1.04.2013
Dokümantasyon No	İY.LS.11
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	6
Sayfa Sayısı	7

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUCU
Dipiridamol (tromboliz)	Kafein	Kahve ve çay tüketimi etkiyi azaltır.
Doksazosin (cardura)	Alkol, Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları	Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmamalıdır.
Doksorubisin	,,,,,	Ürün ve ürik asit atılımına yardımcı olması için sıvı alımı arttırılmalıdır.
Dramamine (dimenhidrinat)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.
Dyloxia 30mg kap (duloksetin)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanımı hepatotoksisite riskini artırabilir. Alkolle birlikte alınmamalıdır.
Endol kap (indometazin)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.
Enoksaparin (enox)	Danshen, Dong quai (Melek otu), Evening primrose oil (Çuha çiçeği yağı), Ginkgo Biloba, Policosanol (Polikozanol), Willow bark (Söğüt kabuğu) içeren preparatlar	Danshen, Dong quai (Melek otu), Evening primrose oil (Çuha çiçeği yağı), Ginkgo Biloba, Policosanol (Polikozanol), Willow bark (Söğüt kabuğu) içeren preparatlardan kaçınılmalıdır.
Epirubisin	,,,,,,,	Ürün ve ürik asit atılımına yardımcı olması için sıvı alımı arttırılmalıdır.
Epitoin (fenitoin sodyum)	Alkol, kalsiyum, alüminyum, magnezyum veya demir içeren preparatlar	Alındıktan sonra 2 saat boyunca kalsiyum, alüminyum, magnezyum veya demir içeren preparatlar kullanılmamalıdır.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.
Etoposid	Greyfurt	Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır.
Famotidin (famodin)	Alkol, kafein	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.
Fentanil sitrat (talinat)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.
Flukonazol (candisept,flukopol)	Süt, yoğurt	Etki azalması
Fluorouracil	,,,,,	Uzun süreli kullanımda vitamin B ihtiyacı artabilir.
Furosemid (lasix)	Alkol,sodyum/tuz	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe fazla tuz/sodyum alımından kaçınılmalıdır.
Gliklazid (diamicon)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	1.04.2013
Dokümantasyon No	İY.LS.11
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	6
Sayfa Sayısı	7

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUCU
Gliserol trinitrat (perlinganit)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır
Haloperidol (norodol)	Alkol, kafein	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Kafein kullanımı sınırlandırılmalıdır.
İbuprofen (dorifen)	Alkol	Alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Merkezi sinir sistemi etkilerini artırabilir. Besinlerle birlikte alındığında plazma pik konsantrasyonu önemli derecede azalır ve 30-60 dakika gecikir. Absorbsiyon miktarı değişmez.Gastrik irritasyonu önlemek için yemeklerle birlikte alınmalıdır.
İsoptin (verapamil)	Alkol, Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları, kafein, greyfurt suyu	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmalıdır. Greyfurt suyu ile birlikte alınmalıdır.
Kapril (kaptopril)	Potasyum, Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.)), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar,sodyum alımı	Potasyum atılımı azalabilir. Potasyum tuzu içeren gıda(muz,kayısı,turunçgiller,patates) veya preparatların kullanımı hiperkalemi riskini artırır.Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.)), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar antihipertansif etkiyi azaltacağı için birlikte kullanılmalıdır. Yüksek tuz(sodyum)alımı antihipertansif etkiyi azaltabilir.
Karbamazepin (karazepin)	Alkol,greycfurt veya greycfurt suyu,St. John's Wort (Sarı kantaron) preparatları	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Greyfurt ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmalıdır. St. John's Wort (Sarı kantaron) preparatları ile birlikte kullanıldığında karbamazepin metabolizması artar. Biyoyararlanımı arttırmak ve irritasyonu azaltmak için yemeklerle birlikte alınmalıdır.
Karboplatin	Ekinezya	Ekinezya ile birlikte kullanıldığında etkide azalma gözlenmiştir.
Ketiapin (ketya, quet)	Alkol, greycfurt ve greycfurt suyu	Alkol ve greycfurt suyu ile birlikte alınmalıdır.
Kladribin	Ekinezya	Ekinezya ile birlikte kullanıldığında etkide azalma gözlenmiştir.
Klindamisin (kln)	,,,,,,,,	Yemeklerle birlikte alınmalıdır.
Klonezapam (rivotril)	Alkol,kafein	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	1.04.2013
Dokümantasyon No	İY.LS.11
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	6
Sayfa Sayısı	7

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUCU
Klorpromazin (largactil)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır.
Kolşisin	Alkol	Ürik asit seviyesini arttıracığı için alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Bol su ile alınmalıdır.
Lansoprazol (lansazol)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır.
Levofloksasin (lefox)	Portakal suyu	Portakal suyu plazma seviyelerini düşürdüğü için birlikte kullanılmalıdır.
Luminaletten (fenobarbital)	Alkol, kafein	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.
Metildopa (ALFAMET tb)	Alkol, meyan (glycyrrhiza glabra) preparatları, magnezyum, folat, vitamin b6, vit.b12, demir, çinko, florür	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmalıdır. Magnezyum, Folat, Vitamin B6, Vitamin B12 alımı arttırılmalıdır. Multivitamin preparatları kullanılabilir. Alındıktan sonra 2 saat boyunca demir, çinko veya florür içeren besin veya preparatlar kullanılmalıdır.
Metoklopramid (metpamid)	Alkol	Alkolle birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır. Yemeklerden yarım saat sonra alınmalıdır. !!!
Metoprolol (beloc,saneloc)	Alkol,Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları	Alkol veMeyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları ile birlikte kullanılmalıdır.
Metotreksat	Süt, kafein	Süt ve kafein alımı sınırlandırılmalıdır.
Metronidazol (flagyl)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır.
Midazolam (sedozolam)	Greyfurt ve greyfurt suyu	Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmalıdır.
Moksifloksasin (atafloks tb)	,,,,,,	Bol su ile alınmalıdır
Monodoks (doksisisiklin)	Alkol,süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve preparatlar, demir, alüminyum tuzları ve antiasitler, magnezyum, demir	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Alınmadan önce 2 saat boyunca veya alındıktan sonra 6 saat boyunca süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve preparatlar, demir, alüminyum tuzları ve antiasitlerden kaçınılmalıdır. Bol su ile alınmalıdır. Alındıktan sonra 2 saat boyunca kalsiyum, alüminyum, magnezyum veya demir içeren preparatlar kullanılmalıdır.
Morfin	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	1.04.2013
Dokümantasyon No	İY.LS.11
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	6
Sayfa Sayısı	7

KULLANILAN İLAÇ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ETKİLEŞİM SONUCU
Nitrogliserin (nitrolingual pump)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır
Olanzapin (rexapin,olnegis)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır.
Paklitaksel	Ekinezya, greyfurt, greyfurt suyu	Ekinezya ile birlikte kullanılmalıdır. Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmalıdır.
Parasetamol	Alkol	Birlikte kullanımı hepatotoksisite riskini artırır. Alkolle birlikte alınmalıdır.
Pentoksifilin (trentilin, Onpent)	Kafein	Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.
Petidin (petisel)	Alkol	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır
Progestan (progesteron)	Alkol, kafein	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.
Sertralin (seralin)	Alkol, greyfurt suyu,St. John's Wort (Sarı Kantaron) preparatları	Alkol ile birlikte kullanılmalıdır. St. John's Wort (Sarı Kantaron) preparatları birlikte kullanılmalıdır. Greyfurt suyu ile birlikte alınmalıdır.
Siklofosamid	,,,,,,	Günde en az 2-3 litre su içilmelidir.İritasyonu azaltmak için yemekle birlikte alınmalıdır.
Sisplatin	Ekinezya	Ekinezya ile birlikte kullanıldığında etkide azalma gözlenmiştir.
Spirololokton (ALDACTONE-A tb)	Alkol, potasyum	Alkolle birlikte kullanılmalıdır. Besinlerle birlikte kullanımı biyoyararlanımı artırmaktadır. Potasyum atılımı azalabilir. Potasyum tuzu içeren gıda ve preparatların kullanımı hiperkalemiye neden olabilir.
Tamsulosin (tamprost)	,,,,,,	Her gün aynı öğünde, yemekten yarım saat sonra alınmalıdır. Yemekle birlikte alımı plazma seviyesini en aza indirir.
Warfarin (coumadin,warfmadin)	K vitamini,e vitamini,alkol,St. John's Wort (Sarı Kantaron) preparatları ,k vitamini,Sarımsak (Allium sativum), Zencefil (Zingiber officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi (Aesculus hippocastanum) besinleri ve preparatları	K vitamini antikoagülanların etkisini azaltır. E vitamini kanama riskini azaltır. Alkolle birlikte kullanılmalıdır. St. John's Wort (Sarı Kantaron) preparatları birlikte kullanılmalıdır. K vitamini içeren gıda (Yeşil yapraklı sebzeler) ve preparatlarla birlikte alınmalıdır.Sarımsak (Allium sativum), Zencefil (Zingiber officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi (Aesculus hippocastanum) besinleri ve preparatlarının alımı kısıtlanmalıdır.