



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**GEBELİKTE VE EMZİRME-SÜT VERMEDE
KULLANILMAYACAK İLAÇLAR LİSTESİ**

| | |
|------------------|------------|
| Yayın Tarihi | 20.07.2016 |
| Dokümantasyon No | İY.LS.16 |
| Revizyon Tarihi | 23.10.2022 |
| Revizyon No | 3 |
| Sayfa Sayısı | 4 |

| Sıra No | ETKİN MADDE | GEBELİK KATEGORİSİ | LAKTASYONDA KULLANIMI |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 5-Florourasil Ampul/Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 2 | Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 50 mg Flakon | D | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR |
| 3 | Alprazolam 0,5 Mg Tablet | D | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR |
| 4 | Amikasin sülfat 100 mg/2ml Flakon/Ampul | D | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR |
| 5 | Amikasin Sülfat 500mg/2ml Flakon/Ampul | D | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR |
| 6 | Amiodaron HCl 150 mg/3 ml IV Ampul | D | KONTRENDİKE |
| 7 | Amiodaron HCl 200 mg Tablet | D | KONTRENDİKE |
| 8 | Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik kaplı tablet | C (1/2. TRİMESTER, D (3. TRİMESTER) | DİKKATLİ KULLANILMALIDIR. |
| 9 | Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet | C (1/2. TRİMESTER, D (3. TRİMESTER) | DİKKATLİ KULLANILMALIDIR. |
| 10 | Atorvastatin 10 mg Film Tablet/Tablet | X | KONTRENDİKE |
| 11 | Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul | C | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR |
| 12 | Azasitidin 100 mg SC Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 13 | Bendamustin hidroklorid 100 mg Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 14 | Benzidamin Hcl %0,15+Klorhekzidin glukonat %0,12 200ml Gargara | C (GEBELİKTE KULLANIMI KONTRENDİKE) | KONTRENDİKE |
| 15 | Benzidamin Hcl %0,15+Klorhekzidin glukonat %0,12 30ml Sprey | C (GEBELİKTE KULLANIMI KONTRENDİKE) | KONTRENDİKE |
| 16 | Bevasizumab Flk | D | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 17 | Bleomisin sülfat 15 mg (IU) Ampul/Flakon | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 18 | Bortezomib 3.5 mg Toz Flakon | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 19 | Dakarbazin 200 mg Flakon | X | KONTRENDİKE |
| 20 | Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul | C | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 21 | Deksketoprofen 25 mg Film Tablet | C (1/2. TRİMESTER), D (3. TRİMESTER) | KONTRENDİKE |
| 22 | Deksketoprofen 25 mg/ml 2 ml Ampul | C (1/2. TRİMESTER), D (3. TRİMESTER) | KONTRENDİKE |
| 23 | Demir karboksimaltoz 500 mg/10 ml 10 ml Flakon | X (1. TRİMESTER), C (2/3. TRİMESTER) | RİSKLİ DEĞİL |
| 24 | Desitabin 50 mg Enjektabl Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 25 | Diazepam 10 mg/2 ml Ampul | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 26 | Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 27 | Diklofenak sodyum 1 % 50 g Jel/Emüljel | C/D (3.TRİMESTER) | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 28 | Diklofenak sodyum 50 mg Enterik Draje/Enterik Tablet/Enterik Film Tablet | C (1/2. TRİMESTER, D (3.TRİMESTER) | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 29 | Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IM Ampul | C/D (3.TRİMESTER) | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |

| | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 30 | Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | C (GEBELİKTE KULLANIMI KONTRENDİKE) | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 31 | Diltiazem hidroklorür 60 mg Film Tablet/Tablet | C | KONTRENDİKE |
| 32 | Doksisiklin 100 mg Kapsül | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 33 | Doksorubisin hidroklorür flakon | D | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR |
| 34 | Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul | C | KULLANILMAMALIDIR |
| 35 | Dosetaksel Flakon | D | KULLANILMAMALIDIR |
| 36 | Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul | C | KULLANILMAMALIDIR |
| 37 | Epirubisin Hidroklorür | D | KULLANILMAMALIDIR |
| 38 | Esmolol hidroklorür 2500mg/250ml inf. İçin Çözelti | C/D (2/3. TRİMESTER) | KULLANILMAMALIDIR |
| 39 | Etofenamat %5 40gr Jel | C/D (3. TRİMESTER) | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 40 | Etopozid Ampul/Flakon | D | KULLANILMAMALIDIR |
| 41 | Feniramin maleat 22.7 mg Tablet | C | KONTRENDİKE |
| 42 | Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | C | KONTRENDİKE |
| 43 | Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml 5 ml Ampul | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 44 | Fenobarbital 15 mg Tablet | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 45 | Flukonazol 2mg/ml 50ml IV flakon-torba | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 46 | Furosemid 20 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | C | KONTRENDİKE |
| 47 | Furosemid 40 mg Tablet | C | KONTRENDİKE |
| 48 | Gemsitabin Flk | D | KONTRENDİKE |
| 49 | Gentamisin sülfat 160 mg/2 ml 2 ml Ampul | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR. |
| 50 | Gentamisin sülfat 20 mg 2 ml Ampul/Flakon | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR. |
| 51 | Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR. |
| 52 | Gliklazit 30 mg MR(uzatılmış salımlı) tablet | C | KONTRENDİKE |
| 53 | Hidroksiprogesteron kaproat 500 mg ampul | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 54 | Hidroksiüre 500 mg Kapsül | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR. |
| 55 | Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20mg/ml 1 ml Ampul | C | KONTRENDİKE |
| 56 | İbuprofen 100 mg/5 ml Oral Süspansiyon | C/D (3.TRİMESTER) | KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR. |
| 57 | İbuprofen 4 mg/ml 100 ml Flakon | C/D (3.TRİMESTER) | KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR. |
| 58 | İloprost trometamol 20 mcg/ml 1 ml IV Ampul | X | KONTRENDİKE |
| 59 | İndometazin 100 mg Supozituar | B (1/2.TRİMESTER) D (3.TRİMESTER) | EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR |
| 60 | İrinotekan hidroklorür trihidrat IV Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 61 | İvabradin 5 mg Film Tablet/Tablet | X | KONTRENDİKE |
| 62 | Kandesartan sileksetil 16 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Tablet | D | KONTRENDİKE |

| | | | |
|----|---|------------------------------------|---|
| 63 | Kaptopril 25 mg Tablet | D | KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR. |
| 64 | Karboplatin Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 65 | Ketamin 50 mg/ml 10 ml Flakon | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 66 | Kladribin 2 mg/ml 5 ml Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 67 | Klopidogrel 75 mg Film Tablet/Tablet | B | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 68 | Klorheksidin glukonat 0.12% + Benzidamin hidroklorür 0.15% 200 ml Gargara | C | KONTRENDİKE |
| 69 | Kolşisin 0.5 mg Draje | D | KONTRENDİKE |
| 70 | Levosimendan 2.5 mg/ml 5 ml Flakon | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 71 | Levofloksasin 500 mg/100 ml IV flakon | C | KULLANILMAMALIDIR |
| 72 | Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg/ml 2 ml Ampul | C (1/2.TRİMESTER) X (3.TRİMESTER) | KONTRENDİKE |
| 73 | Metformin HCl 1000 mg Film Tablet/Tablet | B | KONTRENDİKE |
| 74 | Metilen mavisi 50mg/5ml ampul | X | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 75 | Metoklopramid HCl 10 mg/2 ml 2 ml Ampul | B | KONTRENDİKE |
| 76 | Metotreksat 50 mg Ampul/Flakon | X | KONTRENDİKE |
| 77 | Metronidazol 5 mg/ml 100 ml İnfüzyonluk Solüsyon (Setsiz) | İLK TRİMESTERDE KULLANILMAMALIDIR. | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 78 | Metronidazol 500mg tablet/kapsül | İLK TRİMESTERDE KULLANILMAMALIDIR. | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 79 | Midazolam 1 mg/ml 5 ml IM/IV/Rektal Ampul | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 80 | Midazolam 5 mg/ml 3 ml IM/IV/Rektal Ampul | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 81 | Moksifloksasin hidroklorür 400 mg Film Tablet | C | KONTRENDİKE |
| 82 | Moksifloksasin Hcl 400mg/250ml IV Flakon | C | KONTRENDİKE |
| 83 | Nivolumab Flakon | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 84 | Oksitetrasiklin HCl 5 mg/g + Polimiksin B sülfat 10000 IU/g 3.5 g Göz Merhemi | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 85 | Oksitosin 5İÜ ampul | X | KULLANILABİLİR |
| 86 | Okzaliptatin IV Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 87 | Ondansetron 4 mg/2 ml 2 ml IM/IV Flakon | D (1.TRİMESTER) B (2/3. TRİMESTER) | KULLANILMAMALIDIR |
| 88 | Paklitaksel IV Flakon | D | KULLANILDIĞI SÜRECE EMZİRME YAPILMAMALIDIR. |
| 89 | Panitumumab Flakon | C | KULLANILMAMALIDIR |
| 90 | Pemetrekset (Pemetrekset Disodyum Hemipentahidrat) | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR. |
| 91 | Pertuzumab 420 mg/14 ml Flakon | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 92 | Propiltiyourasil 50mg Tablet | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 93 | Ramipril 5 mg tablet | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 94 | Ritüksimab flakon | C | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 95 | Siklofosamid Flakon | D (KONTRENDİKE) | KULLANILMAMALIDIR |

| | | | |
|-----|--|--------------------|--|
| 96 | Sisplatin IV Flakon | D | KONTRENDİKE |
| 97 | Sitarabin (Sitosin arabinosid) 40 mg/2 ml Ampul | D | KULLANILMAMALIDIR |
| 98 | Sodyum Valproat 333mg+Valproik Asit 145mg Tablet | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 99 | Sodyum valproat 400mg flakon | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR |
| 100 | Sodyum klorür 0.9 % + Hidroksi etil nişasta 6 % 500 ml IV Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/ Torba (Setsiz) | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 101 | Tenoksikam 20 mg IM/IV Flakon | C/D (3. TRİMESTER) | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 102 | Tigesiklin 50 mg 5 ml IV Flakon | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 103 | Tiyokolşikosid 4 mg Film Tablet/Kapsül/Tablet | X | KONTRENDİKE |
| 104 | Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml 2 ml Ampul | X | KONTRENDİKE |
| 105 | Tolvaptan 15mg tablet | X | KONTRENDİKE |
| 106 | Topotekan (Topotekan Hidroklorür) | D | KONTRENDİKE |
| 107 | Trastuzumab 150mg flakon | D | KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR |
| 108 | Varfarin Na 5mg Tablet | X | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 109 | Vinblastin sülfat 10 mg 10 ml IV Flakon | D | DİKKATLE KULLANILMALIDIR |
| 110 | Vinkristin sülfat 1 mg 1 ml IV Flakon | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR |
| 111 | Vinorelbin (Vinorelbin Tartarat) | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR |
| 112 | Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 300000 IU/ml 1 ml Ampul | C | KONTRENDİKE |
| 113 | Vorikonazol 200 mg 30 ml IV İnfüzyon | D | EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR |
| 114 | Zoledronik asit 4 mg/5 ml 5 ml Flakon/Enjektör | D | KONTRENDİKE |