



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi  
**ÇOKLU İLAÇ STABİLİTELERİ LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.05.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.27
Revizyon Tarihi	24.10.2022
Revizyon No	1
Sayfa Sayısı	2

S.NO	MÜSTAHZAR ADI	KISA ÜRÜN BİLGİSİNDE YER ALAN AÇILDIKTAN SONRAKİ SAKLAMA KOŞULU
1	ACTRAPİD HM 100IU/ML 10ML FLK	Kullanılmaya başlandıktan sonra veya yedek olarak taşınırken:25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalıdırveya dondurulmamalıdır. Işıktan korumak için flakon dış karton ambalajında saklanmalıdır.
2	HUMULIN-R FLAKON	Flakon açıldıktan sonra 30°C altında saklanarak 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.
3	LANTUS SOLOSTAR KARTUS ICEREN ENJ. KALEMI 100 IU/ml 5x3 ml kalem	Direkt ışıktan ve sıcaklıktan korumak şartıyla, tıbbi ürün maksimum 4 hafta süre ile 25°C'nin altında saklanabilir. Kullanımdaki kalemler buzdolabında saklanmamalıdır. Her enjeksiyondan sonra ışıktan korumak için kalemin kapağı geri takılmalıdır.
4	NOVORAPID FLEXPEN 100 IU/ml 5x3 ml kalem	Kullanım esnasında veya yedek olarak taşınırken: Ürün en fazla 4 hafta saklanmalıdır.Ürün en fazla 4 hafta saklanmalıdır.
5	İBUFEN PEDIATRİK ŞURUP	25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır.
6	KLAMER SUSPANSİYON 125 mg/5 ml 70 ml şişe	Süspansiyon hazırlandıktan sonra 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında 14 gün saklanabilir.
7	KLAMER SUSPANSİYON 250 mg/5 ml 50 ml şişe	Süspansiyon hazırlandıktan sonra 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında 14 gün saklanabilir.
8	KLAVUNAT BID FORTE ORAL SUSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 400 mg/57 mg 70 ml şişe	Sulandırılmamış toz 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Sulandırılan süspansiyon buzdolabı içinde (2-8°C) saklanmalı ve 7-10 gün içinde kullanılmalıdır. Dondurulmamalıdır.
9	MUCOLATOR 150 ML ŞURUP HAZIR.İÇİN TOZ	25°C altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Kullanıma hazır şurup buzdolabında (2 - 8°C) 12 gün süreyle aktivitesini korur.
10	ALCAİNE %0,5 15ML GÖZ DAMLASI	Açıldıktan sonra veya oda sıcaklığında saklanırsa maksimum bir ay içinde kullanılmalıdır.

11	NITROLINGUAL PUMP PUSKURTME SPREY 0.4 mg/doz 15.4 ml şişe	NİTROLİNGUAL® 25 °C'yi geçmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır. Dondurulmamalı, ısı ve ışıktan korunmalıdır.
12	PRICAIN %2 ENJEKSİYONLUK COZ. ICEREN FLAKON %2 1x20 ml flakon	Çoklu doz içeren flakonlar, flakon açıldıktan sonra 3 günden daha fazla süre ile kullanılmamalıdır.
13	SALRES 100MCG 200 DOZ AEROSOL	Saşeler açıldıktan sonra, flakonlar 3 ay içinde kullanılmalıdır. Şaşeler açıldıktan sonra flakonlar ışıktan korunmalıdır.
14	STAFINE VİSKOZ GOZ DAMLASI %1 5g tüp	Açıldıktan sonra 25°C altındaki oda sıcaklığında 28 gün içinde kullanılmalıdır.
15	MAGNESIE CALCINEE LAFAR 100 G TOZ	30°C altındaki oda sıcaklığında kapağı sıkıca kapalı halde saklanmalıdır. Hazırlandıktan sonra son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.
16	MIKOSTATIN 100.000 IU/ML ORAL SUSPANSİYON (48 ML)	30°C altındaki oda sıcaklığında kapağı sıkıca kapalı halde saklanmalıdır. Ürün açıldıktan sonra raf ömrü süresince kullanılabilir.
17	RETROVIR 50 MG/5 ML 200 ML SURUP	30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklanır. Ürün açıldıktan sonra raf ömrü süresince kullanılabilir.
18	DUPHALAC 667 MG/ML 300 ML SURUP	25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Zarar görmemiş, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Ürün açıldıktan sonra raf ömrü süresince kullanılabilir.

İnsülinin etkinliği buzdolabında saklandığı sürece stabil kalır. Kullanılmaya başlandıktan sonra ise; ilgili müstahzarın kısa ürün bilgisinde yer alan talimatlara göre hareket edilir. Eğer kısa ürün bilgisinde saklama koşulu ile ilgili bilgi yer almıyorsa hastane ortamında muhafaza edilen insülinler açıldıktan sonra kapakları kapalı şekilde, ışık ve ısıdan korunarak oda (25°C'nin altında) sıcaklığında 28 gün saklanır. Açılan ilacın üzerine ambalaj etiketi yapıştırılarak gerekli bilgiler kayıt altına alınmalıdır.

Kısa ürün bilgisinde saklama koşulu ile ilgili bilgi yer almıyorsa açıldıktan 28 gün sonra kalan doz imha edilir. Şurupların açıldıktan imha edileceği süreye kadar paketi atılmamalı, paketin üzerine ambalaj etiketi yapıştırılarak gerekli bilgiler kayıt altına alınmalıdır.