



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
1	% 0.9 NaCl 1000mL Irrigasyon Solüsyonu Polipropilen Şişe	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
2	%0,9 Nacl 1000 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
3	%0,9 NaCl 150 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
4	%0,9 NaCl 3000 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
5	%0,9 Nacl 500 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
6	%10 Dekstroz 500 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
7	%20 Dekstroz 500 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
8	%20 Mannitol 150ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
9	%3 NaCl 150ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
10	%3.33 Dekstroz %0.3 Sodyum Klorür Solusyonu 500ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
11	%5 Dekstroz %0.2 NaCl 500ml Serum Torba	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
12	%5 Dekstroz 1000mL Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
13	%5 Dekstroz 500 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
14	%5 Dekstroz+%0,45 NaCl 1000ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
15	%5 Mannitol 3000mL ürolojik irrigasyon sol. torba setsiz	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
16	300 mg/ml İyotlu Radyopak madde içeren 100 ml flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
17	300 mg/ml İyotlu Radyopak madde içeren 50 ml flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
18	5-Florourasil Ampul/Flakon	D	KONTRENDİKE
19	Adenozin 10mg/2ml Ampul	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
20	Adrenalin 1 mg Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
21	Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 50 mg Flakon	D	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
22	Aktif Kömür 50 g Oral Süspansiyon	C	KULLANILABİLİR
23	Allopurinol 300 mg Tablet	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
24	Alprazolam 0,5 Mg Tablet	D	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
25	Alteplaz 50 mg Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
26	Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
27	Amfoterisin B (Lipozomal) 50 mg IV Flakon	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI ÖNERİLMEMEKTEDİR
28	Amikasin sülfat 100 mg/2ml Flakon/Ampul	D	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
29	Amikasin Sülfat 500mg/2ml Flakon/Ampul	D	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
30	Aminofilin (Teofilin etilendiamin) 240mg Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
31	Amiodaron HCl 150 mg/3 ml IV Ampul	D	KONTRENDİKE



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
32	Amiodaron HCl 200 mg Tablet	D	KONTRENDİKE
33	Amlodipin Bezilat 10 mg Tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
34	Amlodipin Bezilat 5mg Tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
35	Amoksisilin Trihidrat 400mg+Potasyum Klavulanat 57mg 70ml Süspansiyon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
36	Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Film Tablet/Tablet	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
37	Ampisilin 1000 mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
38	Ampisilin 250 mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
39	Ampisilin 500 mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
40	Ampisilin sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 500 mg IM/IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
41	Ampisilin sodyum 250 mg + Sulbaktam sodyum 125 mg IM/IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
42	Ampisilin sodyum 250 mg + Sulbaktam sodyum 125 mg IM/IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
43	Anhidr Monobazik Sodyum Fosfat 19g+Disodyum Hidrojen Fosfat 7g 210ml Sol.	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
44	Aripiprazol 5 mg Film Tablet/Tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
45	Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
46	Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg Supozituar	B	SADECE DOKTOR TAVSİYESİ İLE KULLANILMALIDIR
47	Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg/5 ml Oral Süspansiyon/Şurup/Eliksir	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
48	Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Film Tablet/Tablet	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
49	Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik kaplı tablet	C (1/2. TRİMESTER, D (3. TRİMESTER)	DİKKATLİ KULLANILMALIDIR.
50	Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet	C (1/2. TRİMESTER, D (3. TRİMESTER)	DİKKATLİ KULLANILMALIDIR.
51	Asetilsistein 100 mg/ml 3 ml Ampul	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
52	Asetilsistein 40 mg/ml 150 ml Süspansiyon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
53	Asetilsistein 40mg/ml 100 ml Pediatrik Şurup	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
54	Asetilsistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
55	Asiklovir 250 mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
56	Asiklovir 50 mg/g 10 g Krem	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
57	Atorvastatin 10 mg Film Tablet/Tablet	X	KONTRENDİKE
58	Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul	C	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
59	Azasitidin 100 mg SC Flakon	D	KONTRENDİKE
60	Azitromisin 500 mg Film Tablet/Tablet	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
61	Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 5 g Göz Pomadı	C	KULLANILABİLİR
62	Bendamustin hidroklorid 100 mg Flakon	D	KONTRENDİKE



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
63	Benzatin benzilpenisilin 1200000İÜ Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
64	Benzatin benzilpenisilin 2400000İÜ Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
65	Benzidamin Hcl %0,15+Klorheksidin glukonat %0,12 200ml Gargara	C (GEBELİKTE KULLANIMI KONTRENDİKE)	KONTRENDİKE
66	Benzidamin Hcl %0,15+Klorheksidin glukonat %0,12 30ml Sprey	C (GEBELİKTE KULLANIMI KONTRENDİKE)	KONTRENDİKE
67	Betahistin Dihidroklörür 8 mg Tablet/Kapsül	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
68	Betametazon dipropiyonat 6.43 mg/ml + Betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml 1 ml Ampul	C	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
69	Bevasizumab 100mg Flk	D	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
70	Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
71	Bisakodil 5 mg + Sennozid B 3 mg Draje	B	KULLANILMAMALIDIR
72	Bisoprolol fumarat 5 mg Film Tablet/Lak Tablet	C	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
73	Bleomisin sülfat 15 mg (IU) Ampul/Flakon	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
74	Bortezomib 3.5 mg Toz Flakon	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
75	Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
76	Budesonid 200mcg/doz Ölçülü Doz İnhaler	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
77	Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
78	Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 4 ml Ampul	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
79	Butamirat sitrat 15mg/5ml Şurup	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
80	C-1 Esteraz İnhibitörü 500 IU iv Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
81	Dakarbazin 200 mg Flakon	X	KONTRENDİKE
82	Daptomisin Flakon	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
83	Darbepoetin alfa 150 mcg/0.3 ml Enjektör	C	RİSK FAKTÖRÜ AÇISINDAN YETERLİ BİLGİ YOKTUR. FAKAT KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
84	Deksametazon 1 mg/ml 5 ml Göz Damlası	C	RİSK FAKTÖRÜ AÇISINDAN YETERLİ BİLGİ YOKTUR. FAKAT KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
85	Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul	C	KONTRENDİKE
86	Deksketoprofen 25 mg Film Tablet	C (1/2. TRİMESTER, D (3. TRİMESTER)	KONTRENDİKE
87	Deksketoprofen 25 mg/ml 2 ml Ampul	C (1/2. TRİMESTER, D (3. TRİMESTER)	KONTRENDİKE
88	Deksmedetomidin hidroklorür 100 mcg/ml 2 ml IV Flakon	C	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.
89	Dekstran 40 10 % + Sodyum klorür 0.9 % 500 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setli)	C	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.
90	Demir karboksimaltoz 500 mg/10 ml 10 ml Flakon	X (1. TRİMESTER), C (2/3. TRİMESTER)	RİSKLİ DEĞİL
91	Dengeli Elektrolit Solüsyonu 1000 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
92	Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
93	Denosumab 120 mg/1.7 ml Flakon	C	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
94	Desitabin 50 mg Enjektabl Flakon	D	KONTRENDİKE
95	Desloratadin 5mg Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
96	Diazepam 10 mg/2 ml Ampul	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
97	Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
98	Diflukortolon Valerat %0,1+İzokonazol Nitrat %1 Krem	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
99	Digoksin 0,5mg Ampul	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
100	Diklofenak sodyum 1 % 50 g Jel/Emülgel	C/D (3.TRİMESTER)	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
101	Diklofenak sodyum 50 mg Enterik Draje/Enterik Tablet/Enterik Film Tablet	C (1/2. TRİMESTER, D (3.TRİMESTER)	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
102	Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IM Ampul	C/D (3.TRİMESTER)	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
103	Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul	C (KONTRENDİKE)	KONTRENDİKE
104	Diltiazem hidroklorür 60 mg Film Tablet/Tablet	C (KONTRENDİKE)	KONTRENDİKE
105	Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
106	Dinoproston Ovül 10mg	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
107	Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg Film Tablet/Tablet	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
108	Dipiridamol 75 mg Draje/Film Tablet	B	KULLANILABİLİR
109	Dobutamin 250 mg/20 ml 20 ml Ampul/Flakon	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
110	Doksazosin 4 mg Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
111	Doksisiklin 100 mg Kapsül	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
112	Doksorubisin hidroklorür flakon	D	KULLANILMAMALIDIR
113	Domperidon 10mg Tablet/Kapsül	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
114	Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul	C	KULLANILMAMALIDIR
115	Dosataksel flakon	D	KULLANILMAMALIDIR
116	Duloksetin hidroklorür 30mg Kapsül	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
117	Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
118	Enoksaparin 40 mg/0.4 ml Enjektör	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
119	Enoksaparin 60 mg/0.6 ml Enjektör	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
120	Enoksaparin 80 mg/0,8ml Enjektör	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
121	Epirubisin Hidroklorür	D	KULLANILMAMALIDIR
122	Ertapenem 1 g IM/IV Flakon	B	KULLANILMAMALIDIR
123	Esmolol hidroklorür 2500mg/250ml inf. İçin Çözelti	C/D (2/3 TRİMESTER)	KULLANILMAMALIDIR
124	Esomeprazol sodyum 40 mg IV Flakon	B	KULLANILMAMALIDIR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
125	Essitalopram oksalat 10mg tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
126	Etambutol HCl 500 mg Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
127	Etofenamit %5 40gr Jel	C/D (3. TRİMESTER)	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
128	Etopozid Ampul/Flakon	D	KULLANILMAMALIDIR
129	Faktör IX 500 IU IV Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
130	Famotidin 20 mg Film Tablet/Tablet	B	ANNE SÜTÜNE GEÇER. KULLANILMAMALIDIR
131	Famotidin 20 mg/5 ml IM/IV Ampul/Flakon	B	ANNE SÜTÜNE GEÇER. KULLANILMAMALIDIR
132	Feniramin maleat 22.7 mg Tablet	C	KONTRENDİKE
133	Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul	C	KONTRENDİKE
134	Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml 5 ml Ampul	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
135	Fenobarbital 15 mg Tablet	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
136	Fenobarbital 15 mg Tablet	D	KULLANILMAMALIDIR
137	Fentanil 0.05 mg/ml 2 ml Ampul	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
138	Ferri Hidroksit Sakkaroz IV Flakon/ampul 2700 Mg	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
139	Ferro glisin sülfat 567.7 mg Duodenal Kapsül	A	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
140	Fibrinojen (insan) 1000mg flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
141	Filgrastim (G-CSF) 48 MIU 0.5 ml Enjektör/Şırınga	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
142	Flukonazol 2 mg/ml 50 ml Flakon/Torba	D	KULLANIMI ÖNERİLMEMEKTEDİR
143	Flumazenil 0,5 Mg 5 Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
144	Flutikazon propiyonat 125mcg Ölçülü Doz İnhaler	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
145	Flutikazon Propiyonat 1mg/ml 2 ml nebul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
146	Fosaprepitant 150 mg iv Flakon	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR
147	Fosfomisin Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
148	Fosfomisin 3 g Şaşe	B	KULLANILABİLİR
149	Furosemid 20 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul	C	KONTRENDİKE
150	Furosemid 40 mg Tablet	C	KONTRENDİKE
151	Fusidik asit %1 göz damlası	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
152	Gadoterik asit 27,932 g/100 ml 10 ml IV Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
153	Gemsitabin 200 mg iv Flakon	D	KONTRENDİKE
154	Gentamisin sülfat 160 mg/2 ml 2 ml Ampul	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
155	Gentamisin sülfat 20 mg 2 ml Ampul/Flakon	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
156	Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
157	Gliklazit 30 mg MR(uzatılmış salımlı) tablet	C	KONTRENDİKE
158	Glukagon HCl 1 mg Flakon	B	KULLANILABİLİR
159	Gümüş sülfadiazin 1% 40 g Krem	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
160	Haloperidol 2 mg/ml 20 ml Damla	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
161	Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
162	Hamamelis virginiana distilatı 25 % 30 g Merhem/Pomad	-	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
163	Heparin sodyum 5000 IU/ml 5 ml IV/SC Flakon	C	KULLANILABİLİR.
164	Hepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml 1 ml Flakon/Şırınga/Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
165	Hidroksiprojesteron kaproat 500 mg ampul	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
166	Hidroksiüre 500 mg Kapsül	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
167	Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20mg/ml 1 ml Ampul	C	KONTRENDİKE
168	Human Albumin %20 100 ML Solüsyon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
169	İbuprofen 100 mg/5 ml Oral Süspansiyon	C/D (3.TRİMESTER)	KULLANILMASI ÖNERİLMEKTEDİR.
170	İbuprofen 4 mg/ml 100 ml Flakon	C/D (3.TRİMESTER)	KULLANILMASI ÖNERİLMEKTEDİR.
171	İloprost trometamol 20 mcg/ml 1 ml IV Ampul	X	KONTRENDİKE
172	İmipenem 500 mg + Silastatin 500 mg IM Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
173	İndometazin 100 mg Supozituar	B (1/2.TRİMESTER) D (3.TRİMESTER)	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
174	İnsan insülini (Rek. DNA kökenli) 100 IU/ml 10 ml Flakon	B	KULLANILABİLİR
175	İnsan Rho-D IG 300 mcg/doz 2 ml Enjektör/Flakon	C	KULLANILABİLİR
176	İnsülin aspart (Rek. DNA orijinli) 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalem/Kartuş	B	KULLANILABİLİR
177	İnsülin Aspart 100IU Subkutan Kullanım İçin Enj. Kalem	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
178	İnsülin detemir 100IU kullanıma hazır enjeksiyon kalemi	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
179	İnsülin Glargin 100IU Subkutan Kullanım İçin Enj. Kalem	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
180	İnsülin glusilin 100IU kullanıma hazır enjeksiyon kalemi	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
181	İnsülin Lispro 25IU+İnsülin Lispro Protamin 75IU kullanıma hazır enjeksiyon kalemi	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
182	İnsülin Lispro 50IU+İnsülin Lispro Protamin 50IU kullanıma hazır enjeksiyon kalemi	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
183	İnsülin NPH 100 IU/ML Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
184	İpratropiyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml Nebül İnhalasyon Solüsyonu	C	FAYDALARI ÜSTÜN GELMEDİKÇE KULLANILMAMALIDIR.
185	İpratropiyum bromür anhidr 500 mcg/2 ml 2 ml İnhalasyon Solüsyonu	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
186	İrinotekan hidroklorür trihidrat IV Flakon	D	KONTRENDİKE



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
187	İtrakonazol 100mg Kapsül	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
188	İvabradin 5 mg Film Tablet/Tablet	X	KONTRENDİKE
189	İzoleks-S 1000ml Solüsyon Vb. Serum Torba(SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
190	İzoleks-S 500ml Solüsyon Vb. Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
191	İzolen-M 1000 ml Vb. Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
192	İzolen-M 500 ml Vb. Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
193	İzolen-P 500ml Vb. Serum Torba (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
194	İzosorbid Dinitrat 5mg Sublingual Tb.	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
195	Kalsiyum folinat 200 mg/20 ml 20 ml IM/IV Flakon	C	GEREKLİ OLDUĞUNDA KULLANILABİLİR.
196	Kalsiyum folinat 300 mg/30 ml 30 ml IM/IV Flakon	C	GEREKLİ OLDUĞUNDA KULLANILABİLİR.
197	Kalsiyum glukonat monohidrat 225 mg/10 ml + Kalsiyum levulinat dihidrat 572 mg/10 ml 10 ml Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
198	Kandesartan sileksetil 16 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Tablet	D	KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR.
199	Kandesartan sileksetil 16 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Tablet	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR
200	Kaptopril 25 mg Tablet	D	KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR.
201	Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
202	Karbamazepin 200 mg Tablet	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR
203	Karbomer 2 mg/g 10 g Oftalmik Jel	C	KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR.
204	Karboplatin Flakon	D	TEDAVİ GEREKLİYSE EMZİRME SONLANDIRILMALIDIR.
205	Karvedilol 12.5 mg Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
206	Kasporfungin asetat 50 mg IV Flakon	C	İLACI KULLANAN ANNE EMZİRMEMELİDİR.
207	Kasporfungin asetat 70 mg IV Flakon	C	İLACI KULLANAN ANNE EMZİRMEMELİDİR.
208	Ketamin 50 mg/ml 10 ml Flakon	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
209	Ketiapin fumarat 25 mg Film Tablet/Tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
210	Kladribin 2 mg/ml 5 ml Flakon	D	KONTRENDİKE
211	Klaritromisin 250 mg/5 ml 50 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Toz/Granül	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
212	Klaritromisin 500mg IV/IM Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
213	Klaritromisin 500mg Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
214	Klindamisin fosfat 600 mg 4 ml Ampul	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
215	Klonazepam 2.5 mg/ml 10 ml Damla	D	EMZİRME DURDURULMALIDIR
216	Klopidogrel 75 mg Film Tablet/Tablet	B	KONTRENDİKE
217	Kloramfenikol % 1 oftalmik pomad	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzcce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
218	Klorheksidin glukonat 0.12% + Benzidamin hidroklorür 0.15% 200 ml Gargara	C	KONTRENDİKE
219	Klorpromazin 5 mg/ml 5 ml Ampul	C	KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR.
220	Kolistimetet 150mg flakon	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
221	Kolşisin 0.5 mg Draje	D	KONTRENDİKE
222	Kondroidin Polisülfat (Heparinoid) 445mg 40gr krem	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
223	Labetalol 100 mg Flakon	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
224	Laktatlı Ringer Solüsyonu 1000 ml PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setli)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
225	Laktuloz 667/670 mg/ml 300 ml Oral Solüsyon/Şurup	B	KULLANILABİLİR.
226	Lansoprazol 30 Mg Tablet/Kapsül (Blister Ambalaj)	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
227	Levatirasetam 500mg film tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
228	Levetirasetam 500 mg/5 ml 5 ml IV Flakon	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
229	Levodopa 100 mg + Benserazid 25 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet	C	EMZİREN ANNELERDE KULLANILMAMALIDIR
230	Levofloksasin 500 mg Film Tablet/Tablet	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
231	Levofloksasin 500 mg/100 ml IV flakon	C	KULLANILMAMALIDIR
232	Levosimendan 2.5 mg/ml 5 ml Flakon	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
233	Levotiroksin Sodyum 0,1mg Tablet	A	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
234	Lidokain %5 pomad	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
235	Lidokain 10 % 50 ml Sprey	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
236	Lidokain HCl 20 mg/ml + Epinefrin HCl 0.0125 mg/ml 2 ml Ampul	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR.
237	Lidokain HCl 20 mg/ml + Epinefrin HCl 0.0125 mg/ml 2 ml Ampul	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
238	Lidokain hidroklorür 20mg/5ml Ampul	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
239	Linezolid 2mg/ml 300ml flakon	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
240	Linezolid 600mg 10 tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
241	Loperamid HCl 2 mg Tablet	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
242	Magnetik Rezonans Görüntüleme Kullanım İçin Kontrast Madde 10ml Flk	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
243	Magnezyum 365 mg Efervesan Tablet/Saşe	B	HEKİME DANIŞILARAK KULLANILABİLİR
244	Magnezyum hidroksit 100 g Toz	B	BİLİNMEMEKTEDİR
245	Magnezyum sülfat 15% 10 ml Ampul	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
246	Mannitol 20 % 100 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setli)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
247	Meropenem 1000 mg IV Flakon	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
248	Mesna	B	KULLANILMAMASI ÖNERİLİR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
249	Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg/ml 2 ml Ampul	C (1/2.TRİMESTER) X (3.TRİMESTER)	KONTRENDİKE
250	Metformin HCl 1000 mg Film Tablet/Tablet	B	KONTRENDİKE
251	Metildopa 250 mg Film Tablet/Tablet	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
252	Metilen mavisi 50mg/5ml ampul	X	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
253	Metilergobasin Maleat 0,2mg/ML Ampul	C	KULLANILMAMALIDIR
254	Metilprednizolon Asetat 40mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
255	Metilprednizolon sodyum süksinat 16mg tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
256	Metilprednizolon sodyum süksinat 20 Mg Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
257	Metilprednizolon sodyum süksinat 250 Mg Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
258	Metilprednizolon sodyum süksinat 40 Mg Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
259	Metoklopramid HCl 10 mg/2 ml 2 ml Ampul	B	KONTRENDİKE
260	Metoprolol tartarat 5 mg/5 ml Ampul	C	İLACI KULLANAN ANNELER EMZİRMEMELİDİR.
261	Metoprolol tartarat 50 mg Değiştirilmiş Salımlı/Kontrollü Salımlı Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
262	Metotreksat 50 mg Ampul/Flakon	X	KONTRENDİKE
263	Metronidazol 5 mg/ml 100 ml İnfüzyonluk Solüsyon (Setsiz)	İLK TRİMESTERDE KULLANILMAMALIDIR. B (2/3. TRİMESTER)	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
264	Metronidazol 500mg tablet/kapsül	İLK TRİMESTERDE KULLANILMAMALIDIR. B (2/3. TRİMESTER)	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
265	Mısır Bazlı 130/0,4 Hidroksietil Nişasta %6 500ml	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
266	Midazolam 1 mg/ml 5 ml IM/IV/Rektal Ampul	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
267	Midazolam 5 mg/ml 3 ml IM/IV/Rektal Ampul	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
268	Mirtazapin 15 mg Ağızda Dağılan Tablet	C	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.
269	Moksifloksasin Hcl 400mg/250ml IV Flakon	C	KONTRENDİKE
270	Moksifloksasin hidroklorür 400 mg Film Tablet	C	KONTRENDİKE
271	Moksifloksasin hidroklorür 5 mg/ml 5 ml Oftalmik Solüsyon	C	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.
272	Mometazon Furoat %0,1 30g Merhem	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
273	Monobazik sodyum fosfat 28.5 g/177 ml + Dibazik sodyum fosfat 10.5 g/177 ml 210 ml Lavman	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
274	Monokomponent İnsan İnsülini(Regüler) 100IU/ML Flakon	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
275	Morfin HCl 10 mg/ml 1 ml Ampul	C	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.
276	Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 1000 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setli)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
277	Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setli)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
278	Multiple İdame Elektrolit Solüsyonu-M %5 Dekstrozu 1000 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setli)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
279	Multivitamin IV Flakon	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
280	Multivitamin IV/IM Flakon	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
281	Mupirosin %2 krem	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
282	Nebivolol 5 mg Tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
283	Neostigmin metilsülfat 0.5 mg/ml 1 ml Ampul	C	İLAÇ ALIMI VEYA EMZİRME DURDURULMALIDIR
284	Nifedipin 10 mg Film Tablet/Yumuşak Jelatin Kapsül/Mikropellet Kapsül	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
285	Nistatin 100.000 IU/ml 48/50 ml Oral Süspansiyon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
286	Nitrofurazon 0.2% 56 g Pomad	C	KULLANILMAMALIDIR
287	Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 0.4 mg/püskürtme 250 Sprey	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
288	Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 1 mg/ml 10 ml IV Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
289	Nivolumab Flakon	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
290	Norepinefrin 1 mg/ml 25 ml IV Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
291	Normal İnsan İmmunoglobulini IV	C	KULLANILMAMASI ÖNERİLİR
292	Ofloksasin 15mg Steril Oftalmik Solüsyonu	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
293	Oksimetazolin HCl 0.5 mg/ml 10 ml Burun Spreyi/Nazal Sprey	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
294	Oksitetrasiklin HCl 5 mg/g + Polimiksin B sülfat 10000 IU/g 3.5 g Göz Merhemi	D	KULLANILMAMALIDIR
295	Oksitosin 5 IU 1 ml Ampul	X	KULLANILABİLİR
296	Oksolamin Fosfat 50mg/5ml Şurup	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
297	Okzaliptatin Flakon	D	KONTRENDİKE
298	Olanzapin 5mg ağızda dağılılabir tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
299	Ondansetron 4 mg/2 ml 2 ml IM/IV Flakon	D (1. TRİMESTER) B (2/3. TRİMESTER)	KULLANILMAMALIDIR
300	Ornidazol 500 mg Film Tablet/Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
301	Ornidazol 500mg Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
302	Oseltamivir (Oseltamivir Fosfat)	C	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.
303	Paklitaksel Flakon	D	KULLANILMAMALIDIR
304	Palonosetron (Palonosetron Hidroklorür)	B	KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
305	Panitumumab Flakon	C	KULLANILMAMALIDIR
306	Pantoprazol sodyum 40 mg Enterik Tablet	C	KULLANILMAMALIDIR
307	Pantoprazol sodyum 40 mg IV Flakon	C	KULLANILMAMALIDIR
308	Parenteral kullanım için süksinile jelatin %4 500ml (SETSİZ)	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
309	Pegfilgrastim 6 mg/0,6 ml Şırınga	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
310	Pemetrekset (Pemetrekset Disodyum Hemipentahidrat)	D	KULLANILMAMASI ÖNERİLİR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
311	Penisilin G benzatin 1.200.000 IU Flakon	B	ANNE SÜTÜNE GEÇER. DİKKATLE KULLANILMALIDIR
312	Penisilin G benzatin 2.400.000 IU Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
313	Pentoksifilin 100 mg/5 ml Ampul	C	ANNE SÜTÜNE GEÇER. KULLANILMAMALIDIR
314	Perindopril arjinin 5 mg + İndapamid 1.25 mg Film Tablet/Tablet	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMASI ÖNERİLMEMEKTEDİR
315	Pertuzumab 420 mg/14 ml Flakon	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
316	Petidin hidroklorür 50 mg/ml 2 ml Ampul	C	ANNE SÜTÜNE GEÇER. TEK DOZ İŞE LAKTASYON DURDURULMAZ
317	Piperasilin sodyum 2 g + Tazobaktam sodyum 0.25 g IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
318	Piperasilin sodyum 4 g + Tazobaktam sodyum 0.5 g IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
319	Pirasetam 1 g/5 ml 5 ml Ampul	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
320	Poliakrilik Asit (Karbomer)	C	İNSAN DENEYLERİ YAPILMAMIŞTIR. FAKAT KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
321	Polimiksin B sülfat 500000 IU Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
322	Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
323	Potasyum klorür 7.5% 10 ml IV Ampul	C	KULLANILMASI ÖNERİLMEZ
324	Potasyum sitrat 2170 mg + Potasyum karbonat 2000 mg Efervesan Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
325	Potasyum sitrat 2170 mg + Potasyum karbonat 2000 mg Efervesan Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
326	Prasugrel 10 mg Film Tablet/Tablet	B	KULLANILMAMALIDIR
327	Prilokain HCl 20 mg/ml 20 ml Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
328	Progesteron 100 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
329	Propafenon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
330	Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
331	Propiltiyourasil 50mg Tablet	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
332	Propofol 10 mg/ml 20 ml IV Ampul	C	KULLANILMAMALIDIR
333	Propranolol HCl 40 mg Tablet	C	ANNE SÜTÜ ATILIR. DİKKATLE KULLANILMALIDIR
334	Protamin Hcl 5000 IU/5ml Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
335	Ramipril 5 mg tablet	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
336	Remifentanil 2 mg/5 ml IV Flakon	C	KULLANILMAMALIDIR
337	Remifentanil 5 mg/10 ml IV Flakon	C	KULLANILMAMALIDIR
338	Rh 0 (D) İmmunglobulin 1500 IU Kullanıma Hazır Enjektör veya Flakon	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR
339	Rifamisin SV 250 mg/3 ml + Lidokain 10 mg/3ml 3 ml Ampul	C	ANNE SÜTÜNE GEÇER. KULLANILMAMALIDIR
340	Ritüksimab 500 mg/50 ml 50 ml IV Flakon	C	KULLANILMAMALIDIR
341	Roküronyum bromür 10 mg/ml 10 ml Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
342	Salbutamol 100mcg/doz ölçülü doz inhaler	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
343	Salbutamol sülfat 1 mg/ml 2.5 ml Nebul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
344	Salbutamol Sülfat+İpratropium Bromür 2,5 ML Nebul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
345	Salbutamol Sülfat+İpratropium Bromür 200 ölçülü doz inhaler	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
346	Sefazolin 1 g IM/IV Flakon	B	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
347	Sefepim HCl 1 g IM/IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
348	Sefoperazon sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 1 g IM/IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
349	Sefoperazon sodyum 2 g + Sulbaktam sodyum 1 g IM/IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
350	Sefotaksim 500 mg IM/IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
351	Seftazidim 2 g + Avibaktam 500 mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
352	Seftazidim pentahidrat 1g im/iv flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
353	Seftriakson disodyum 1 g IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
354	Seftriakson disodyum 500 mg IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
355	Sefuroksim aksetil 500 mg Film Tablet/Tablet	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
356	Sefuroksim sodyum 50 mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
357	Sefuroksim Sodyum 750mg Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
358	Sennozit A+B 1.5 mg/ml 150 ml Oral Solüsyon	C	KULLANILMAMALIDIR
359	Setuksimab Flakon	C	RİSK FAKTÖRÜ AÇISINDAN YETERLİ BİLGİ YOKTUR. FAKAT KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
360	Sevofluran 250 ml Uçucu Çözelti/Likit	B	RİSK FAKTÖRÜ AÇISINDAN YETERLİ BİLGİ YOKTUR. FAKAT KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
361	Siklofosamid Flakon	D (KONTRENDİKE)	KULLANILMAMALIDIR
362	Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
363	Simetikon 300mg+Alverin sitrat 60mg yumuşak kapsul	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
364	Siprofloksasin Hcl 500mg Tablet/Kapsül	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
365	Siprofloksasin laktat 200 Mg/100 ML IV Flakon	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
366	Siprofloksasin laktat 400 Mg/200 ML IV Flakon	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
367	Sisplatin Flakon	D	KONTRENDİKE
368	Sitarabin (Sitosin arabinosid) 40 mg/2 ml Ampul	D	KULLANILMAMALIDIR
369	Siyanokobalamin (B12) 1000mcg/ml ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
370	Sodyum aljinat 500 mg/10 ml + Sodyum bikarbonat 267 mg/10 ml + Kalsiyum karbonat 160 mg/10 ml 200 ml Oral Süspansiyon	A	KULLANILABİLİR
371	Sodyum Bikarbonat 84 mg/ml 10 ml ampul	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
372	Sodyum fusidat 2 % 20 g Merhem/Pomad	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
373	Sodyum klorür 0,9 % + Hidroksi etil nişasta 6 % 500 ml IV Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/ Torba (Setsiz)	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
374	Sodyum Valproat 333mg+Valproik Asit 145mg Tablet	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
375	Sodyum valproat 400mg flakon	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
376	Somatostatin	C	İNSAN DENEYLERİ YAPILMAMIŞTIR.FAKAT KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
377	Sorbitol 530 mg/g + Sodyum sitrat 90 mg/g + Gliserin 370 mg/g 10 g Lavman	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
378	Spironolakton 25 mg Film Tablet/Tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
379	Streptomisin sülfat 1 g Flakon	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
380	Sugammadex sodyum 100 mg/ml 2 ml IV Flakon	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
381	Süksinile jelatin (Modifiye sıvı jelatin) 40 mg/ml + Sodyum klorür 7 mg/ml 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
382	Teikoplanin 400 mg Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
383	Tenekteplaz 10000 U 50 mg IV Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
384	Tenoksikam 20 mg IM/IV Flakon	C/D (3. TRİMESTER)	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
385	Teofilin etilendiamin 24 mg/ml 10 ml IV Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
386	Tigesiklin 50 mg 5 ml IV Flakon	D	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
387	Tikagrelor 90 mg Film Tablet/Tablet	C	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
388	Tiyokolşikosid 4 mg Film Tablet/Kapsül/Tablet	X	KONTRENDİKE
389	Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml 2 ml Ampul	X	KONTRENDİKE
390	Tiyopental sodyum 1 gr flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
391	Tizanidin 6 mg Değiştirilmiş Salımlı Mikropellet Kapsül	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
392	Tobramisin %0,3 oftalmik merhem	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
393	Tolvaptan 15mg tablet	X	KONTRENDİKE
394	Topotekan (Topotekan Hidroklorür)	D	KONTRENDİKE
395	TPN Solüsyonu 1440 ML (Periferik)-Soya Yağlı	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
396	TPN Solüsyonu 1540 ML (Santral)-Soya Yağlı	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
397	Tramadol HCl 50 mg/ml 2 ml Ampul	C	KULLANIMI ÖNERİLMEMEKTEDİR
398	Traneksamik asit 50 mg/ml 5 ml Ampul	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
399	Trastuzumab 150 mg Flakon	D	KULLANIMINDAN KAÇINILMALIDIR
400	Triamsinolon asetonid 40 mg/ml 1 ml IM/İntraartiküler Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
401	Trimetazidin HCl 35 mg Modifiye Salımlı Film Tablet/Tablet	C	KULLANILMAMALIDIR
402	Trimetobenzamid HCl 100 mg/2 ml 2 ml Ampul	C	EMZİREN KADINLARDA YETERLİ DENEYİM BULUNMADIĞINDAN, LAKTASYONDAKİ GÜVENİLİRLİĞİ YETERİNCE SAPTANMAMIŞTIR.
403	Triticum vulgare 50 mg/g 40 g Krem	B	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILABİLİR



T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
**İLAÇLARIN GEBELİK KATEGORİSİ VE LAKTASYONDA
KULLANIM LİSTESİ**

Yayın Tarihi	24.10.2022
Dokümantasyon No	İY.LS.28
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa Sayısı	14

SIRA NO	ETKİN MADDE	GEBELİK KATEGORİSİ	LAKTASYONDA KULLANIMI
404	Valasiklovir 500mg Tablet/Kapsül	B	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
405	Vankomisin 1 g IV Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
406	Varfarin Na 5mg Tablet	X	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
407	Veküronyum bromür 10 mg IV Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
408	Verapamil Hcl KKH 120 mg yavaş salımlı film tablet	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
409	Vinblastin sülfat 10 mg 10 ml IV Flakon	D	FAYDA ZARAR İLİŞKİSİNE BAKILARAK KARAR VERİLİR.
410	Vinkristin Sülfat	D	RİSK FAKTÖRÜ AÇISINDAN YETERLİ BİLGİ YOKTUR. FAKAT KULLANILMAMASI ÖNERİLİR.
411	Vinkristin sülfat 1 mg 1 ml IV Flakon	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
412	Vinorelbin (Vinorelbin Tartarat)	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
413	Vitamin B1 (Tiamin) 25 mg/2 ml + Nikotinamid (Niasinamid) 50 mg/2 ml + Vitamin B2 (Riboflavin) 2 mg/2 ml + Vitamin B6 (Piridoksin) 5 mg/2 ml + Dekspantenol (D-pantenol) 8.6 mg/ml 2 ml Ampul	C	KULLANILMAMALIDIR
414	Vitamin B12 (Siyankobalamin) 1 mg 1 ml Ampul	C	KULLANILABİLİR
415	Vitamin C (Askorbik asit) 500 mg/5 ml 5 ml IV Ampul/Flakon	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
416	Vitamin D3 (Kolekalsiferol)	C	İNSAN SÜTÜNDE ÇOK AZ D VİTAMİNİ BULUNUR. BEBEK DOĞDUKTAN SONRA D VİT. DESTEĞİ ALABİLİR.
417	Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 300000 IU/ml 1 ml Ampul	C	KONTRENDİKE
418	Vitamin K1 2mg/0,2ml Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
419	Vitamin K1 10mg/1ml Ampul	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
420	Vorikonazol 200 mg 30 ml IV İnfüzyon	D	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
421	Zeytinyağlı Bazlı Lipid-Aminoasit-glikoz içeren 1500ml Periferel Parenteral Beslenme Ürünü	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
422	Zeytinyağlı Bazlı Lipid-Aminoasit-glikoz içeren 1500ml Santral Parenteral Beslenme Ürünü	C	DİKKATLE KULLANILMALIDIR
423	Zidovudin 10 mg/ml 20 ml IV Flakon	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
424	Zidovudin 50 mg/5 ml 200 ml Şurup	C	EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANILMAMALIDIR
425	Zoledronik asit 4 mg/5 ml 5 ml Flakon/Enjektör	D	KULLANILMAMALIDIR